

🏠 / Maladies / Cancer / Cancer du col de l'utérus

La France, mauvaise élève européenne dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus

La France accumulerait un retard important dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, selon la Société française de pathologies cervico-vaginales (SFCPCV). Les taux de dépistages, mais aussi de vaccination contre le papillomavirus, sont particulièrement bas dans le pays. Parallèlement, de nombreuses interventions chirurgicales seraient inappropriées.

Par la rédaction d'Allodocteurs.fr, avec AFP

Rédigé le 13/01/2017



La France, mauvaise élève européenne dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus

"La situation en France est très préoccupante. Nous sommes en train d'accumuler un retard important par rapport aux autres pays européens" résume le Dr Jean-Luc Mergui, président de la Société française de colposcopie et de pathologies cervico-vaginales (SFCPCV).

Parmi ses sujets de préoccupation figure la **vaccination contre le papillomavirus** destinée à prévenir les **lésions précancéreuses du col utérin** : le taux de couverture de ce vaccin, recommandé chez les filles de 11 à 15 ans, atteint à peine 15% en France - où il fait l'objet d'une grande défiance - contre 90% en Finlande ou 85% au Royaume-Uni, relève-t-il.

En 2015, le cancer du col de l'utérus a touché près de 2.800 femmes en France et en a tué un peu plus d'un millier, selon les chiffres de la SFCPCV.

Le dépistage du cancer du col de l'utérus qui passe par des **frottis vaginaux** réalisés tous les 3 ans entre 25 et 65 ans, stagne lui aussi, avec un taux de couverture de l'ordre de 50 à 60% des femmes concernées, contre 85% au Royaume-Uni, selon la SFCPCV qui préconise la mise en place d'un dépistage organisé.

Le dépistage se fait actuellement de manière "spontanée" et baisse sensiblement après l'âge de 50 ans, relève le Dr Mergui, tout en insistant sur la nécessité d'un meilleur suivi chez les femmes présentant des anomalies.

Trop de conisations ?

Selon la SFPCPV, un tiers des 25.000 "conisations" (intervention consistant à enlever chirurgicalement une partie du col de l'utérus) réalisées chaque année en France peuvent être considérées comme "excessives et sans contrôle de qualité". Cette intervention n'est pourtant pas anodine chez les femmes en âge de procréer car elle peut entraîner par la suite des accouchements prématurés, d'autant plus nombreux que le volume retiré est important.

C'est ce qui arrive notamment lorsque la conisation est réalisée sans colposcopie (sans contrôle microscopique) comme c'est le cas actuellement dans près de 70% des cas, selon la Société. Cette dernière estime également que près la moitié des 3.500 ablations de l'utérus (hystérectomies) réalisées pour des lésions du col de l'utérus ne seraient pas non plus justifiées.

Pour éviter ces excès, la SFPCPV a mis en place une **charte de qualité**, qui s'est fixé comme objectif d'homogénéiser la formation des gynécologues chargés de prendre en charge la prévention du cancer du col et de vérifier que leurs pratiques sont **conformes aux recommandations nationales et européennes**.

avec AFP

Sponsorisé par Ligatus



169 € L'aspirateur avec sac Miele C1 Hardfloor EcoLine est conçu pour aspirer tous type...
Aspirateur avec sac Mi...

Demandez un devis maintenant et recevez les conseils pour s'organiser.
Vous déménagez bientôt ?

Un trafic qualifié & plus de leads grâce à la qualité du réseau Ligatus
Votre Publicité Ligatus

Atteignez vos objectifs de performance avec Ligatus #1 des Réseaux de Native Ads
Cibler & Convertir

Atteignez vos objectifs de performance avec Ligatus #1 des Réseaux de Native Ads
Cibler & Convertir

Atteignez vos objectifs de performance avec Ligatus #1 des Réseaux de Native Ads
Cibler & Convertir

Publicité


Voir aussi sur Allodocteurs.fr



Cancer du col de l'utérus : le risque de récurrence après une conisation ?



Vaccination anticipée contre le papillomavirus : l'exemple australien




Que reproche-t-on au Gardasil® ?



Papillomavirus : un vaccin sans danger



Cancer du col de l'utérus : la conisation, une solution radicale ?



Quels sont les différents stades des lésions dues aux papillomavirus ?